



DDr. Clemens Zsifkovits

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie

Unsere Empfehlungen vor kieferchirurgischen Eingriffen

Essen und Trinken

Bei Ihnen wird ein Eingriff in Lokalanästhesie durchgeführt. Essen und Trinken vor dem Eingriff ist nicht nur möglich, sondern wird sogar empfohlen, da die adäquate Nahrungsaufnahme eine stabile Kreislaufsituation während des Eingriffs unterstützt.

Schmerzmittel

Die Einnahme von Schmerzmitteln, die Acetylsalicylsäure (ASS) enthalten (z.B. Aspirin, Aspro, Thomapyrin etc.) sollte, aufgrund der damit einhergehenden Veränderung der Blutgerinnung, im Zeitraum von 7 Tagen vor dem Eingriff, vermieden werden. Müssen Sie jedoch ASS oder andere Medikamente, die die Blutgerinnung beeinflussen (sog. „blutverdünnende Medikamente“), aufgrund Ihrer Grunderkrankung regelmäßig einnehmen, sollten Sie diese Medikamente keinesfalls selbstständig, ohne ärztliche Anordnung absetzen.

Antibiotika

Sollten bei Ihnen die Einnahme von Antibiotika vor dem Eingriff notwendig sein, nehmen Sie diese bitte unserer Verordnung entsprechend ein. Sie dienen der Vorbeugung seltener aber schwerwiegender Infektionen.

Fahrtüchtigkeit

Lokalanästhetika können die Reaktionsfähigkeit vorübergehend herabsetzen. Daher sollte nach dem Eingriff die aktive Teilnahme am Straßenverkehr vermieden werden. Aus diesem Grund empfehlen wir, sich nach dem Eingriff abholen zu lassen und dies bereits im Voraus zu planen.

**Bei Fragen oder Unklarheiten zögern Sie bitte nicht, Kontakt mit uns aufzunehmen!
Wir helfen Ihnen gerne weiter!**

Ihr Team der Praxis DDr. Clemens Zsifkovits